

## 1. DENOMINATION

### SUANOVIL

Poudre soluble à usage oral

A usage vétérinaire

## 2. COMPOSITION

Mélange spiramycine-acide adipique (= spiramycine 1.500.000 U.I.) - Lactosum q.s.p. 1 g.

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre soluble à usage oral.

## 4. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

### 4.1 Propriétés pharmacodynamiques

Antibiotique appartenant au groupe des macrolides, la spiramycine est active contre les mycoplasmes.

La spiramycine est douée d'un tropisme tissulaire pour le poumon. Elle s'y retrouve à des concentrations plus élevées que dans le sang.

Pour la spiramycine des valeurs de CMI sont observées (à partir d'isolats d'origine de poules):

- *Mycoplasma gallisepticum*: la CMI 50 est de 16 µg/ml. Plus de 42% des souches étudiées ont une CMI inférieure ou égale à 0,5 µg/ml. Les CMI s'échelonnaient de <0,125 à >128 µg/ml.
- *Mycoplasma synoviae*: la CMI 50 est de 1 µg/ml. Environ 35% des souches ont une CMI inférieure ou égale à 0,5 µg/ml, et plus de 82% des souches ont une CMI inférieure ou égale à 2 µg/ml. Les CMI s'échelonnaient de <0,125 à 32 µg/ml.

La spiramycine se fixe dans les bactéries et s'y maintient à un taux bactériostatique.

Ces propriétés expliquent son activité in vivo nettement supérieure à celle in vitro et son action prolongée après administration.

### 4.2 Propriétés pharmacocinétiques

Paramètres pharmacocinétiques pendant 3 jours d'administration (0,8 g/l):

	D0 + 10 h	D1 + 10 h	D2 + 10 h
C (ng/ml) :	189	219	313

## 5. INFORMATIONS CLINIQUES

### 5.1. Espèce cible

Poules.

### 5.2. Indications


Traitement des affections dues aux mycoplasmes sensibles à la spiramycine.

### 5.3. Contre-indications

Aucune connue.

### 5.4. Effets indésirables

Aucun effet indésirable n'a été constaté lorsque le produit est utilisé à la dose recommandée.



10 JAN. 2006

### **5.5. Précautions particulières d'emploi**

Remplacez l'eau de boisson traitée toutes les 24 heures.

Pendant le traitement ne mettre aucune autre eau de boisson à la disposition des poules.

### **5.6. Utilisation en cas de gravidité et de lactation**

Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

### **5.7. Interactions médicamenteuses et autres**

Aucune interaction n'est connue.

### **5.8. Posologie et mode d'administration**

Administration par voie orale, après dissolution dans l'eau de boisson.

0,8 g de poudre/litre d'eau (1,2 millions UI/l) par jour, pendant 3 jours.

#### Mode d'emploi

SUANOVIL est solubilisé dans l'eau de boisson. Une dosette arasée contient environ 5 g de poudre (pour 6,25 l).

### **5.9. Surdosage**

Des études avec des poussins de 2 et 15 jours, traités respectivement avec 3 et 4 fois la dose recommandée, ne montraient pas d'effets indésirables.

### **5.10. Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Aucune.

### **5.11. Temps d'attente**

Viande et abats: 15 jours.

Œufs: Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

### **5.12. Précautions particulières de sécurité à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux**

Tenir ce produit, comme tous les médicaments, à l'écart des enfants.

## **6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES**

### **6.1. Incompatibilités**

Aucune incompatibilité majeure n'a été identifiée.

### **6.2. Durée de stabilité**

3 ans dans des conditions de température ambiante.


L'eau de boisson traitée: 24 heures.

### **6.3. Précautions particulières de conservation**

Conservation à température ambiante.

### **6.4. Conditionnements**

SUANOVIL (poudre soluble à usage oral) : boîte de 100 g, 250 g, 500 g, 750 g ou 1kg. Chaque emballage est pourvu d'une dosette qui, arasée, contient environ 5 grammes de poudre.




---

**6.5. Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés**

Les emballages et tout contenu résiduel doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

**7. NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE OU SIEGE SOCIAL DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

MERIAL BELGIUM S.A.  
243 Bld. Sylvain Dupuis  
B-1070 Bruxelles



10 JAN. 2006